

---

---

FORMICHE RACCOLTE NELL'APPENNINO ABRUZZESE  
DAL SIG. PIO BISLETI

MARIO CONSANI

Dopo aver esaminato il materiale mirmecologico raccolto per me nell'Appennino Abruzzese dall'amico Pio Bisleti durante l'estate degli anni 1947 e 1948, credo utile pubblicare i reperti risultanti dallo studio delle 26 forme raccolte.

Le località dalle quali proviene il materiale sono: Val di Varri, dintorni di Pescorocchiano, ca. m. 1000 s. l. m. e Valle del Salto, dintorni di Pace, ca. m. 800 s. l. m. Benchè queste località, del Comune di Pescorocchiano, siano comprese nel territorio della Provincia di Rieti, sono da considerarsi geograficamente Abruzzesi e tali infatti erano fino a una ventina di anni fa, quando facevano parte della Provincia de L'Aquila.

---

*Myrmica scabrinodis* Nyl. — Valle del Salto: VIII-47, 2♀♀; Val di Varri: 27-VIII-47, ♀♀, ♀♀, ♂♂; IX-48, ♀♀, ♀♀, ♂♂.

*Aphaenogaster (Attomyrma) subterranea* Latr. — Val di Varri: 27-VIII-1947, diverse ♀♀.

*Messor barbarus capitatus* Latr. — Valle del Salto: VIII-48, numerose ♀♀.

*Messor structor* Latr. — Val di Varri: VIII-48, 1♀; IX-48, 5♀♀.

*Solenopsis fugax* Latr. — Val di Varri: VIII-48, 1♀; IX-48, alcune ♀♀, 1♀ alata, 2 ♂♂.

*Leptothorax tuberum* F. — Val di Varri: IX-47, numerose ♀♀ dentro una galla di *Cinipide*; IX-48, diverse ♀♀.

*Leptothorax nylanderii* Först. — Val di Varri: VIII-48, 1♀; IX-48, 1♂.

*Tetramorium caespitum* L. — Val di Varri: VIII-48, diverse ♀♀; IX-48, numerose ♀♀, ♀♀, ♂♂.

*Liometopum microcephalum* Panz. — Valle del Salto: VIII-48, numerose ♀♀.

*Bothriomyrmex corsicus* var. *liguricus* Em. — Val di Varri: IX-48, alcune ♀♀. (Finora noto solamente di Liguria e Toscana).

*Tapinoma erraticum* Latr. — Valle del Salto: VIII-48, 2♀♀; Val di Varri: VI-48, 1♀ e 1♀ dealata; IX-48, 1♀.

*Plagiolepis pygmaea* Latr. — Val di Varri: IX-48, 2♀♀.

*Camponotus (Tanaemyrmex) aethiops* Latr. — Valle del Salto: VIII-48, 3♀♀; Val di Varri: IX-48, 5♀♀ e 1♂.

*Camponotus (Tanaemyrmex) aethiops* var. *marginatus* Latr. — Valle del Salto: VIII-48, 2♀♀; Val di Varri: 22-VIII-47, 1♀ alata e alcune ♀♀; IX-48, diverse ♀♀. (Finora noto del Canton Ticino, Venezia Giulia, Emilia, Lazio e Molise).

*Camponotus vagus* Scop. — Valle del Salto: VIII-48, 1♀; Val di Varri: VI-48, alcune ♀♀.

- Camponotus (Myrmentoma) piceus* Leach — Valle del Salto : VIII-48, 1 ♀; Val di Varri : VI-48, poche ♂♂; IX-48, alcune ♂♂.
- Lasius niger* L. — Val di Varri IX-48, 2 ♀♀ alate.
- Lasius alienus* Först. — Valle del Salto : VIII-48, diverse ♂♂; Val di Varri : 22-VIII-47, alcune ♂♂; VI-48, alcune ♂♂; VIII-48, alcune ♂♂; IX-48, diverse ♂♂, 2 ♀♀ alate e alcuni ♂♂.
- Lasius (Chthonolasius) flavus* var. *flavo-myops* For. — Val di Varri : IX-48, numerose ♀♀ e 1 ♀ dealata.
- Lasius (Chthonolasius)* sp. — Val di Varri : VI-48, diverse ♂♂. Fino a che non sarà raccolta la ♀, credo sia meglio lasciare in sospenso la determinazione specifica di questa forma del gruppo *umbratus* Nyl.
- Lasius (Dendrolasius) fuliginosus* Latr. — Val di Varri : 22-VIII-47, alcune ♂♂; IX-48, numerose ♂♂.
- Formica (Serviformica) gagates* Latr. — Val di Varri : VI-48, alcune ♂♂; VIII-48, poche ♂♂; IX-48, 3 ♂♂.
- Formica (Serviformica) fusca* L. — Val di Varri : VI-48, poche ♂♂; IX-48, alcune ♂♂ e 4 ♀♀ dealate.
- Formica (Serviformica) fusca glebaria* Nyl. — Valle del Salto : VIII-48, 3 ♂♂; Val di Varri : IX-48, alcune ♂♂ e 1 ♀ dealata.
- Formica (Serviformica) fusca glebaria* var. *rubescens* For. — Valle del Salto : VIII-48, alcune ♂♂; Val di Varri : IX-48, alcune ♂♂ e 1 ♀ alata.
- Formica rufa pratensis* Retz. — Val di Varri : 22-VIII-47, 2 ♂♂; VI-48, alcune ♂♂.
- Polyergus rufescens* Latr. — Val di Varri : 22-VIII-47, 3 ♂♂. Ho reso nota la presenza di questa specie nell'Appennino Abruzzese, sempre sulla base dei materiali raccolti dal Sig. Bisleti, in una precedente nota (1).

---

(1) M. CONSANI, *Reperti corologici sulle Formiche Italiane*. « Redia », Firenze, vol. XXXII, 1947, pp. 179-182. Cfr. pag. 182).